




Durchschnittliche Abgabenbelastung je Arbeitnehmer

In Prozent des Bruttolohns, Deutschland 1991 bis 2003



Quelle: Bundesministerium für Gesundheit
Stand: 11.2004

bpb: © 2005 Bundeszentrale
für politische Bildung



■ **Durchschnittliche Abgabenbelastung je Arbeitnehmer**

In Prozent des Bruttolohns, Deutschland 1991 bis 2003

■ **Fakten**

Das deutsche Sozialsystem sowie die öffentlichen Ausgaben des Staates werden zu einem beträchtlichen Teil über Arbeitnehmereinkommen finanziert. Die Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung – die Arbeitgeberbeiträge werden hier außen vor gelassen – machen 16,3 Prozent des Durchschnittseinkommens aus. Die Lohnsteuerbelastungen beziffern sich auf 18,8 Prozent.

In der Summe ergibt sich also eine durchschnittliche Gesamtbelastung der Arbeitnehmereinkommen von rund 35 Prozent. Das heißt, dass zwischen dem Brutto- und Nettoeinkommen der Arbeitnehmer eine große Lücke klafft, die seit Beginn der 90er Jahre noch um 5 Prozent zugenommen hat.

■ **Datenquelle**

Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (Hrsg.), Statistisches Taschenbuch 2004

■ **Begriffe, methodische Anmerkungen oder Lesehilfen**

Bei den Abzugsquoten handelt es sich um Durchschnittsgrößen: Die Bruttolohn- und Bruttogehaltssumme, die hier als Maßstab dient, unterliegt nur teilweise der Beitragspflicht. Belastungsfrei sind beispielsweise Beamtengehälter sowie Arbeitnehmerentgelte unterhalb der Geringfügigkeits- und oberhalb der Beitragsbemessungsgrenzen. Insofern liegt die durchschnittliche Sozialabgabenquote je beschäftigten Arbeitnehmer unter der Hälfte des Gesamtbeitragsatzes zur Sozialversicherung.



■ Durchschnittliche Abgabenbelastung je Arbeitnehmer

In Prozent des Bruttolohns, Deutschland 1991 bis 2003

| | Steuerquote | Beitragsquote | Gesamtabzugsquote |
|------|-------------|---------------|-------------------|
| 1991 | 16,3 | 14,3 | 30,5 |
| 1992 | 17,1 | 14,5 | 31,6 |
| 1993 | 16,8 | 14,6 | 31,4 |
| 1994 | 17,2 | 15,4 | 32,6 |
| 1995 | 18,6 | 15,6 | 34,2 |
| 1996 | 19,3 | 15,9 | 35,2 |
| 1997 | 19,5 | 16,6 | 36,2 |
| 1998 | 19,5 | 16,6 | 36,1 |
| 1999 | 19,5 | 16,3 | 35,8 |
| 2000 | 19,3 | 16,2 | 35,4 |
| 2001 | 18,5 | 15,9 | 34,4 |
| 2002 | 18,7 | 16,0 | 34,7 |
| 2003 | 18,8 | 16,3 | 35,1 |

Quelle: Bundesministerium für Gesundheit
Stand: 11.2004