

► Tab 4 Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen

	Tuberkulose	Bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems	Pneumonie	Selbstmord
Gestorbene pro 100 000 Lebende					
	x0222	x0223	x0224	x0225	x0226
Deutsches Reich					
1892	259,1	–	–	148,2	20,5
1910	163,5	79,0	214,8	127,0	21,7
1920	154,2	87,2	225,2	126,9	21,8
1925	106,6	101,9	242,0	93,4	24,5
1932	75,0	132,6	253,9	69,6	28,8
1938	62,3	146,7	309,8	84,1	28,3
Bundesrepublik/Alte Bundesländer					
1950	40,6	174,0	349,9	48,6	20,3
1959	16,8	197,6	443,1	37,1	19,3
1970	8,3	221,4	534,4	32,4	21,5
1980	3,1	254,6	583,9	20,7	20,9
1989	1,7	274,7	552,4	22,4	16,5
2010	0,4	261,0	411,0	23,8	12,0
DDR/Neue Bundesländer					
1950	79,0	172,0	–	70,0	29,0
1970	11,0	218,0	744,0	25,0	30,0
1989	2,0	209,0	712,0	22,0	26,0
2010	0,0	304,0	540,0	26,0	14,0
Deutschland					
1993	1,3	263,3	543,1	20,7	15,6
2000	0,7	256,4	480,7	22,8	13,5
2010	0,4	267,7	431,4	24,3	12,3

Quelle: Reinhard Spree, Gesundheitswesen, in: Thomas Rahlf (Hg.), Deutschland in Daten. Zeitreihen zur Historischen Statistik, Bonn 2015, S. 80

Lizenz: Creative Commons by-nc-nd/3.0/de | Bundeszentrale für politische Bildung 2015 | www.bpb.de

